

# Broadway™ Star

## RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDEL

**Käyttötarkoitus** Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

**Användningsändamål:** För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

### Varoitus

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Sisältää pyroksulaamia ja klorintoseetti-meksyylia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

### Varning

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Innehåller pyroksulam och cloquintocet-mexyl. Kan orsaka en allergisk reaktion.



**1,06 KG**

**50X20MM MINIMUM**  
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE  
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)



# Broadway™ Star

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/  
OGRÄSMEDEL

GROUP 2 (B) HERBICIDE

UFI: HF59-303R-C00C-63Y0

**Käyttötarkoitus** Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

**Användningsändamål:** För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdistä.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

**Käyttäjärühmä:** Ammattikäyttäjät

**Användargrupp:** Yrkesanvändare

**Tehoaine:**

**Verksamma ämne:**

pyroksulaami 70,8 g/kg

pyroksulam 70,8 g/kg

florasulaami 14,2 g/kg

florasulam 14,2 g/kg

**Valmistetyyppi:** WG

**Preparattyp:** WG

**Varastointi:** Säilytetään kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.

**Förvaring:** Förvaras på torr plats skyddat mot frysning.

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä.

**Satsnummer och produktionsdatum:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

**Valmistaja ja pakkaaja:**

**Tillverkare och förpackare:**

Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

**Edustaja Suomessa:** Corteva Agriscience

**Representant i Finland:** Corteva Agriscience

Finland OY, Teknobulevardi 3-5,

Finland OY, Teknobulevardi 3-5,

01530 Vantaa. [www.corteva.fi](http://www.corteva.fi)

01530 Vantaa. [www.corteva.fi](http://www.corteva.fi)

**Luvanhaltija:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H,

**Tilistandsinnehavare:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H,

DK-1411 Köpenhamn K, Tanska. Puh.

DK-1411 Köpenhamn K, Danmark.

+45 4528 0800

Tfn. +45 4528 0800

**Rekisterinumero:** 3366

**Registreringsnummer:** 3366

©™Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies



3 362130 167129

NETTILAVUUS/  
NETTOINNEHÄLL:  
1,06 KG

283554 2312 - FINLAND

**Käyttötarkoitus:**

Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

**Käytön rajoitukset:**

**Vara aika:** 30 vrk

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoituvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine ja sen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialue luokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suoja vyöhyke.

Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

**Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

**Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:**

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja.

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä				
Käyttö	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet		
		vähintään		
		50 %	75 %	90 %
1 x 0.265 g/ha	5 m	3 m	3 m	0 m
2 x 0.105 g/ha	5 m	3 m	0 m	0 m
1 x 0.150 g/ha	3 m	3 m	0 m	0 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet.

Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta [www.tukes.fi/vesistorajoitus](http://www.tukes.fi/vesistorajoitus). Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpainet.

### Resistenssin hallinta:

Valmisteen sisältämät tehoaineet kuuluvat HRAC-ryhmään 2 (B) (ALS-inhibiittori). Riski kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla loholla useana peräkkäisenä vuonna.

### Käyttöohjeet

Broadway Star on lehtivaikutteinen rikkakasvien torjunta-aine syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä. Broadway Star on laajatehoinen rikkakasvientorjunta-aine leveälehtisiin ja heinämäisiin rikkakasveihin, kuten juolavehnä, hukkakaura, luoho, rikkapuntarpää, pelto-orvokki, kierumatara, ruiskaunokki, kiertotatar ja saunakukka.

Broadway Starilla ei saa käsitellä heinien suojaviljoja eikä palkokasvien (kuten apila) suojaviljoja.

Broadway Star sisältää ALS-inhibiittoreihin kuuluvia pyroksulaamia ja florasulaamia. Molemmat tehoaineet liikkuvat kasvissa systeemisesti ja rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi. Teho näkyy muutaman viikon kuluttua ruiskutuksesta.

### Olosuhteet

Broadway Star -valmisteen ruiskutus voidaan aloittaa, kun ilman lämpötila on +6°C ja rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Vältä käsittelyä hyvin kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa tai ennen hallayötä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi, käsittele rikkakasvit niiden ollessa pieniä. Älä käsittele stressaantunutta kasvustoa.

Stressi voi aiheutua kylmyydestä, kuivuudesta, liiasta vedestä, tuohyönteisistä, ravinteiden puutteesta tai jostakin muusta. Broadway Star voi aiheuttaa ohimenevää kasvuston vaalenemista ja kasvun hidastumista. Vaalenemisella ei normaalisti ole vaikutusta satoon.

## KÄYTTÖMÄÄRÄT

Viljelykasvi	Käyttöaika BBCH	Käyttömäärä, g/ha	Torjuttavissa olevat rikkakasvit ja teho		
			95-100%	85-94%	70-84%
Kevätvehnä	21-32	150 + Dassoil	Hukkakaura, rikkasinappi, peltotaskuruoho, Lutukka, pihatähtimo	Kiertotatar, Punapeippi, peltosaunio, kiertotatar, peltoretikka, pelto-orvokki	Juolavehnä, rikkapuntarpää, pihatatar,
		160 + Dassoil	Peltoluoho, Lutukka, pihatähtimo	Kiertotatar, Punapeippi, peltosaunio, silkkiunikko, pelto-orvokki	Ruiskaunokki, juolavehnä, rikkapuntarpää, pihatatar, peltotaskuruoho
Syysvehnä Ruis Ruisvehnä	20-32	215 + Dassoil	Peltoluoho, Lutukka, pihatähtimo	Hietakattara, rikkapuntarpää, kiertotatar, Punapeippi, peltosaunio, silkkiunikko, pelto-orvokki	Ruiskaunokki, juolavehnä, pihatatar, peltotaskuruoho, englanninraiheinä
		265 + Dassoil	Peltoluoho, lanntu, kiertotatar, rikkasinappi, peltotaskuruoho, Lutukka, pihatähtimo	Juolavehnä, hietakattara, rikkapuntarpää, englanninraiheinä, Punapeippi, peltosaunio, silkkiunikko, pihatatar, peltoretikka, pelto-orvokki	Ruiskaunokki, peltolemmikki, kylänurmikka, linnunkaali, peltovillaakko, hanhentatar

### Jaetulla käsittelyllä Broadway Star:illa saadaan 85 -94 % teho hietakattaraan

- Ensimmäinen käsittely: 105 g + kiinnite kasvun alussa, kun rikkakasvit ovat aktiivisessa kasvussa.
- Toinen käsittely: 105 g + kiinnite, 10-14 päivää ensimmäisen käsittelyn jälkeen, viimeistään kasvuasteella BBCH 32.

### Kiinnite

Broadway Star -valmistetta suositellaan käytettäväksi yhdessä Dassoil kanssa, 0,5 l/ha.

### Juolavehnän torjunta

Broadway Star:illa on tehoa juolavehnään, kun ruiskutus tehdään juolavehnän 3-4 lehtiasteella. Jotta juolavehnään saadaan riittävä pitkäaikainen vaikutus, tulee Broadway Star ruiskutusta täydentää glyfosaattiruiskutuksella sadonkorjuun jälkeen.

### Maalaji

Valmistetta voidaan käyttää kaikilla maalajeilla.

### Sateenkestävyys:

Broadway Star on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

### Viljelyrajoitukset

Jos Broadway Star -valmisteella keväällä käsitelty kasvusto joudutaan hävittämään, saa samalle lohkolle kylvää viljaa, maissia tai heinää 6 viikon kuluttua kynnön tai jyrsinän jälkeen. Broadway Star -valmisteella keväällä käsitellyn kasvuston sadonkorjuun jälkeen ei ole viljelyrajoituksia millekään kasville.

### Tankkiseokset

Broadway Staria ei saa sekoittaa tuotteiden kanssa, jotka sisältävät fenoksapropia tai kasvunsääteiden, jotka sisältävät trineksapakkietyyliä, mepikvattikloridia, prohexadionia tai etefonia. Suositeltava ruiskutusväli näihin valmisteisiin on vähintään 7 päivää.

### **Ruiskutusnesteen valmistus**

Broadway Star voidaan ruiskuttaa traktoriin kytkettävällä hydrylisella ruiskulla, joka on hyvässä käyttökunnossa ja kaliproitu valmistajan ohjeiden mukaan. Lisää Broadway Star 100 -300 l/ha vesimäärään. Alinta vesimäärää voidaan käyttää vain avoimessa kasvustossa pieniin rikkakasveihin.

Broadway Star voidaan ruiskuttaa traktoriin kytkettävällä hydrylisella ruiskulla, joka on hyvässä käyttökunnossa ja kaliproitu valmistajan ohjeiden mukaan.

Ruiskun säiliöön täytetään ensin puolet tarvittavasta vesimäärästä, minkä jälkeen lisätään tarvittava määrä Broadway Star -valmistetta

hitaasti suurimpaan mahdolliseen vesimäärään ruiskun yläosasta sekoituspumpun käydessä, täytä säiliö vedellä. Ennen säiliön täyttymistä lisää SURFER-kiinnite. Pidä ruiskun sekoitus päällä koko ruiskutuksen ajan.

Mikäli rakeita ei voida lisätä ruiskuun yläosan kautta ja ruisku on varustettu täyttöastialla, joka voidaan täyttää vedellä, voidaan käyttää seuraavaa tekniikkaa:

1. Täytä täyttöastia puoliksi vedellä
2. Kaada tarvittava määrä Broadway Star rakeita hitaasti täyttöastiaan suurimpaan mahdolliseen vesimäärään.
3. Ime täyttöastian sisältö ruiskun tankkiin ja samaan aikaan lisää puhdasta vettä täyttöastiaan
4. Toista tämä uudelleen niin kauan että tuotetta ei ole täyttöastiassa.

### **Ruiskun puhdistus**

Jotta vältetään muiden kasvien vioittumiselta Broadway Star valmisteen ruiskuttamisen jälkeen, on ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim.

All Clear<sup>1</sup> Extraa tai Ruiskun Tehopesua seuraavasti:

1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
2. Huuhtelee ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus kytkettynä ja huuhtelee suuttimet ja letkut tällä pesuliuksella. Täytä säiliö täyteen vettä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä tankki kokonaan.
4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuksessa, jossa on pesuainetta, esim. 50 ml All Clear Extraa /10 litraa vettä.
5. Huuhtelee tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi vähintään 1/10 osa säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
6. Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille eikä vesistöön tai pohjaveteen.

Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 4.

<sup>1</sup> Rekisteröity tuotemerkki– FMC Agricultural Solutions

**Bruksändamål:**

För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

**Användningsbegränsningar:**

**Karenstid:** 30 dygn

Förebyggande av miljöskador:

Förörena inte vattendrag med produkten eller dess förpackning.

Undvik besprutning i blåsigt väder.

På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendraget för att skydda vattenorganismerna.

Sprutans suganordning för vatten får inte användas för fyllning av behållare från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag.

Bekämpningsmedlet och dess sönderdelningsprodukter kan röra sig i marken varför det inte får användas på viktiga eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattentäkt (grundvattenområdesklasser I och II). Kring brunnar och källor som används för hushållsvattentäkt bör man lämna en skyddszon på minst 30-100 m som inte behandlas med bekämpningsmedel. Användning av bekämpningsmedel på grova mojordar eller grövre jordarter bör undvikas.

Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar skall föras till vederbörlig insamlingsplats för avfall.

**Anvisningar om skyddsutrustning:**

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskeden då det föreligger risk för preparatstänk bör ansiktsskydd/skyddsglasögon användas och i arbetsskeden då andningsvägarna exponeras bör andningsskydd försett med P2/A2-filter användas.

**Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet:**

Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet.

För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan:



Skyddsavstånd med olika munstyckstyper				
Användning	Spaltspridarmunstycke	Munstycken som minskar vindavdrift		
		Minst		
		50 %	75 %	90 %
1 x 0.265 g/ha	5 m	3 m	3 m	0 m
2 x 0.105 g/ha	5 m	3 m	0 m	0 m
1 x 0.150 g/ha	3 m	3 m	0 m	0 m

1) Dyliga munstycken är bl.a. luftassisterade munstycken. Förteckning över munstycken som finns på marknaden för försäljning finns tillgänglig på Tukes nätsidor under adressen [www.tukes.fi/vesistorajoitus](http://www.tukes.fi/vesistorajoitus). I förteckningen visas också tillåtna körhastigheter och brukstryck.

### Resistenshantering:

De verksamma ämnen som preparatet innehåller tillhör HRAC-gruppen 2 (B) (ALS-inhibitorer). I denna grupp är utvecklingsrisken av resistent ogrässtammar stor. För att förhindra utvecklingen av motståndskraftiga ogrässtammar bör man inte efterföljande år på samma skifte använda preparat som tillhör grupp med samma verkningsätt.

### Bruksanvisningar

Broadway Star är ett via bladen verkande bekämpningsmedel mot ogräs i höst- och vårvete, råg och i rågvete. Broadway Star är ett ogräsbekämpningsmedel med bred effekt på ört- och gräsartade ogräs som kvickrot, flyghavre, ängskavle, åkerviol, snärjmåra, blåklint, åkerbinda och baldersbrå.

Med Broadway Star får man inte behandla gräsväxternas skyddssäd och inte heller baljväxternas (såsom klöver) skyddssäd. Broadway Star innehåller till ALS-inhibitorerna hörande pyroxulam och florasulam. Bägge verksamma ämnena rör sig systemiskt i växten och ogräsens tillväxt avstannar omedelbart. Effekten syns några veckor efter besprutning.

### Förhållanden

Broadway Star -preparatets besprutning kan påbörjas då luftens temperatur är +6°C och ogräsens tillväxt är god. Undvik behandling i mycket torra och varma förhållanden eller före frostnatt. För att uppnå bästa effekt skall ogräsen behandlas då de är små.

Bespruta inte stressad gröda. Stressen kan orsakas av kyla, torka, riklig fukt, skadeinsekter, näringsbrist eller någon annan orsak. Broadway Star kan orsaka förbigående ljusfärgning av grödan och en långsammare tillväxt. Ljusfärgningen inverkar normalt inte på skörden.

## BRUKSMÄNGDER

Odlingsväxt	Brukstillpunkt BBCH	Bruksmängd, g/ha	Ogräs som kan bekämpas och effekt		
			95-100%	85-94%	70-84%
Vårvete	21-32	150 + Dassoil	Flyghavre, åkersenap, penninggräs, lomme, våtarv	Snärjmåra, rödplister, baldersbrå, snärjmåra, åker rättika, åkervioli	Kvickrot, ängskavle, trampgräs,
		160 + Dassoil	Åkerven, lomme, våtarv	Snärjmåra, rödplister, baldersbrå, sidenvallmo, åkervioli	Blåklint kvickrot, ängskavle, trampgräs, penninggräs
Höstvete, råg och rågvete	20-32	215 + Dassoil	Åkerven, lomme, våtarv	Sandlosta, ängskavle, snärjmåra, rödplister, baldersbrå, sidenvallmo, åkervioli	Blåklint kvickrot, trampgräs, penninggräs, eng. rajgräs
		265 + Dassoil	Åkerven, kålrot, snärjmåra, åkersenap, penninggräs, lomme, våtarv	Kvickrot, sandlosta, ängskavle, eng. rajgräs, rödplister, baldersbrå, sidenvallmo, trampgräs, åker rättika, åkervioli	Blåklint, åkerförgätmigej, vitgröe, harkål, korsört, pilört

## Delad behandling med Broadway Star ger 85-94 % effekt på sandlosta

- Första behandling: 105 g + fästmedel i början av tillväxten då ogräsen växer aktivt.
- Andra behandling: 105 g + fästmedel, 10-14 dagar efter första behandling, senast på växtstadiet BBCH 32.

## Fästmedel

Det rekommenderas att Broadway Star -preparatet används tillsammans med Dassoil, 0,5 l/ha.

## Kvickrotsbekämpning

Broadway Star har effekt på kvickrot då besprutningen görs på kvickrotens 3-4 bladstadiet. För att få en tillräckligt lång verkningstid på kvickroten bör Broadway Star besprutningen kompletteras med glyfosatbesprutning efter skörden.

## Jordart

Preparatet kan användas på alla jordarter.

## Regntålighet:

Broadway Star är regntåligt en timme efter besprutning.

## Odlingsbegränsningar

Om man är tvungen att bryta en på våren med Broadway Star behandlad gröda får man på samma skifte så stråsäd, majs eller höväxter 6 veckor efter plöjning eller fräsning. Det råder inga odlingsbegränsningar för någon växt efter vårbehandling med Broadway Star.

## Tankblandningar

Broadway Star får inte blandas med övriga preparat som innehåller fenoxaprop eller med växtregulatorer som innehåller trinexapacetyl, mepiqatklorid, prohexadion eller etefon. Rekommenderat sprutintervall till sådana preparat är minst 7 dagar.

## **Beredning av sprutvätskan**

Broadway Star kan besprutas med en traktormonterad spruta i gott skick och som är kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar. Tillsätt Broadway Star i 100-300 l/ha vattenmängd. Den minsta vattenmängden kan användas i öppen gröda då ogräsen är små. Broadway Star kan besprutas med en traktormonterad spruta i gott skick och som är kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar.

Sprutbehållaren fylls till hälften med vatten varefter behövlig mängd Broadway Star-preparat tillsätts via sprutans påfyllningsöppning i så stor vattenmängd som möjligt medan blandning pågår. Fyll därefter den resterande vattenmängden. SURFER-fästmedel tillsätts strax före behållaren är full. Håll sprutans blandare igång under transportkörning och under besprutning.

Om granulaten av någon orsak inte kan tillsättas direkt i behållaren och sprutan är utrustad med påfyllningsanordning, som kan fyllas med vatten, kan följande metod användas:

5. Fyll påfyllningsanordningen till hälften med vatten
6. Tillsätt långsamt behövlig mängd Broadway Star -granulat i så stor vattenmängd som möjligt.
7. Sug påfyllningsbehållarens innehåll i sprutbehållaren och tillsätt samtidigt rent vatten i påfyllningsbehållaren
8. Upprepa tills allt preparat har sugits i sprutbehållaren.

### **Sprutans rengöring**

För att undvika skador på övriga växter efter Broadway Star -besprutning skall sprututrustningen tvättas omsorgsfullt både ut- och invändigt med tvättmedel som är avsett för spruttvätt, t.ex. All Clear<sup>1</sup> Extra eller Ruiskun Tehopesu, enligt följande:

1. Töm sprutbehållaren genast efter besprutning. Tvätta sprutan utvändigt med rent vatten.
2. Skölj sprutbehållaren invändigt och bespruta minst 1/10 av volymen via ramp och munstycken. Töm behållaren helt på åkern.
3. Fyll behållaren till hälften med vatten och tillsätt behövlig mängd tvättmedel. Använd blandaren och skölj munstycken och slangar med den här tvättlösningen. Fyll behållaren med vatten och använd blandaren i 15 minuters tid. Spruta genom munstycken och töm behållaren helt.
4. Munstycken och filter avmonteras och tvättas separat i lösning som består av tvättmedel, t.ex. 50 ml All Clear Extra / 10 l vatten.
5. Skölj behållaren med rent vatten och bespruta vatten genom munstycken minst 1/10 av behållarvolymen. Töm behållaren helt på åkern.
6. Se till att tvättvätskan inte kommer i kontakt med känsliga växter, inte heller i vattendrag eller i grundvatten.

Obs! Om behållaren inte kan tömmas helt skall punkt 3 upprepas före man går till punkt 4.

<sup>1</sup> Registrerat varumärke - FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

# Broadway™ Star

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/  
OGRÄSMEDEL**

**GROUP 2 (B) HERBICIDE**

**UFI: HF59-303R-C00C-63Y0**

**Käyttötarkoitus** Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

**Användningsändamål:** För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

**Käyttäjärhmä:** Ammattikäyttäjät

**Användargrupp:** Yrkesanvändare

**Tehoaine:**

**Verksamma ämne:**

pyroksulaami 70,8 g/kg

pyroksulam 70,8 g/kg

florasulaami 14,2 g/kg

florasulam 14,2 g/kg

**Valmistetyyppi:** WG

**Preparattyp:** WG

**Varastointi:** Säilytetään kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.

**Förvaring:** Förvaras på torr plats skyddat mot frysning.

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:**

**Satsnummer och produktionsdatum:**

Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä.

Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

**Valmistaja ja pakkaaja:**

**Tillverkare och förpackare:**

Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

**Edustaja Suomessa:** Corteva Agriscience

**Representant i Finland:** Corteva Agriscience

Finland OY, Teknobulevardi 3-5,

Finland OY, Teknobulevardi 3-5,

01530 Vantaa. [www.corteva.fi](http://www.corteva.fi)

01530 Vantaa. [www.corteva.fi](http://www.corteva.fi)

**Luvanhaltija:** Corteva Agriscience Denmark

**Tillståndsinnehavare:** Corteva Agriscience

A/S, Langebrogade 3H,

Denmark A/S, Langebrogade 3H,

DK-1411 Kööpenhamina K, Tanska. Puh.

DK-1411 Köpenhamn K, Danmark.

+45 4528 0800

Tfn. +45 4528 0800

**Rekisterinumero:** 3366

**Registreringsnummer:** 3366

<sup>®</sup>Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies



**NETTOTILAVUUS/  
NETTOINNEHÄLL:**  
**1,06 KG**

283554 2312 - FINLAND



**NO PRINT – GLUE PAGE**