

Varoitus

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Erittäin myrkkylistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Vältä pölyn/savun/kausun/sumun/höyryns/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojaakäsineitä/suojaavatetusta/silmiensuoajinta /kasvonsuoajainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ilmenee ihoärsystystä tai ihottumaata: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Jos silmää-ärsytsys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**Warning**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mycett giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oätkomligt för barn.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



3 362130 138075 >



Ariane™ S

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDEL

GROUP 4 (O) HERBICIDE

UFI: 4M44-FOC7-F004-KH9W

Käyttötarkoitus: Rikkakasvienväistelyä syys- ja kevätehänistä, syys- ja kevätohrasta, kaurasta, rukiista ja ruisvehnistä, apilattomien nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmikolta, heinien siemeniviljelyksiltä sekä leikattavilalta nurmikolta ja golfnurmikalta.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Teohaineet:

MCPA 200 g/l
fluoxipyr 40 g/l
klopyralidi 20 g/l

Valmistetyppi: EW

Alin varastointilämpötila on 0°C
(suojattuna jäätymiseltä).

Valmistusperioodi ja

valmistuspäivä: Katso pakauksesta.

Säilyvyys vähintään 2 vuotta

valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:

Corteva Agriscience

Edustaja Suomessa: Corteva Agriscience Finland OY,
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Luvanhallija: Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamina K, Tanska.
Puh. +45 4528 0800

Rekisterinumero: 1683

TM® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated
companies

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i
höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete
och i havre, i klöverfria vallar, höfröodlingar, i
skyddssääd för klöverfria vallar, i värda
gräsmattor och golfplaner.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:

MCPA 200 g/l
fluoxipyr 40 g/l
klopyralid 20 g/l

Preparatyyp: EW

Lägsta förvaringstemperatur är 0°C
(skyddad mot frysning).

Satsnummer och produktionsdatum:

Se behållaren. Hållbar minst 2 år från
tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare:

Corteva Agriscience
Representant i Finland: Corteva Agriscience
Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.
www.corteva.fi

Tillståndsinnehavare: Corteva Agriscience
Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411
Köpenhamn K, Danmark. Tfn. +45 4528 0800
Registreringsnummer: 1683

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 5 L



2211

Käytön rajoitukset:**Varoajat:**

Varoikaa nurmilla on 30 vrk ja ennen tuleentumista korjattavilla viljoilla 40 vrk. Käsitellyllä alalla voidaan käyttää klopyralidia sisältäviä valmisteita aikaisintaan 125 vuorokautta Ariane S:n tai muun klopyralidia sisältävän valmisten käytöstä lukien.

Ariane S -kästtelyn jälkeen juuri- ja mukulakasveja voi viljellä aikaisintaan seuraavalla kasvukaudella.

Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korrenkasvun alkua.

Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää sienten tai syötävien kasvien kasvualustana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saatusta vesia tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesielöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täytöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täytölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojuelaine viedään vaarallisen jätteen keräysteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetaa käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähiinetä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käsitellyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelu:

Valmiste saattaa viottaa käsitellyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja.

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suuntityypeillä					
Käyttö	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaan vähentävät suuttimet ¹⁾			
		vähintään			50 %
		5 m	3 m	0 m	
3.5 L/ha	15 m	3 m	3 m	0 m	
2.5 - 3.0 L/ha	10 m				

¹⁾Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaan vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Resistenssin hallinta:

Valmisten sisältämät tehoaineet kuuluvat HRAC-ryhmään 4 (O) (synteettiset aukiinit). Riski kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tassá ryhmässä vähäinen. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna.

Käyttöohje:

Viljelykasv	Käyttöaika BBCH	Käyttömäärä, l/ha	Torjuttavissa olevat rikkakasvit ja teho	
			>90 %	70-90 %
Kevätviljat ja apilatomien nurmien suojaviljat	21-31, pensomisvaihe, ennen korrenkasvun alkua	2	Jauhosavikka, peltokierto, viisisädetyräkki, kierumataria, peltosaunio, kiertotatar, peltovalvatti, pihatähtimö, jääntirypsi ja -rapsi ja peltotaskuruoho	pelto-ohdake, peltoemäkkä, kurjenpolvet, punapeippi ja pihatatar
		2,5	Ruiskaunokki, jauhosavikka, peltokierto, viisisädetyräkki, kurjenpolvet, kierumataria, sepiväpeippi, peltosaunio, peltolemmikki, silkkiuniikko, kiertotatar, ukontatar, pihatähtimö, lutukka, peitoriketta, rikkasinappi, peltotaskuruoho	pelto-ohdake, peltoemäkkä, punapeippi, pihatatar, hanhentatar, peitovillakko ja pelto-orvokki
Syysviljat	21-31, pensomisvaihe, ennen korrenkasvun alkua	2	Jääntirypsi ja -rapsi, ruiskaunokki, jauhosavikka, kierumataria, peltosaunio, karheapillike, peltolemmikki, silkkiuniikko ja kiertotatar	Lutukka, kurjenpolvet, pihasaunio, persiantädyke ja pihatähtimö
		3	Jääntirypsi ja -rapsi, lutukka, ruiskaunokki, jauhosavikka, peltotähdäkki, kierumataria, pillikkeit, liuskakurjenpolvi, huisakurjenpolvi, peltosaunio, peltolemmikki, silkkiuniikko, kiertotatar, rikkasinappi ja pihatähtimö	Pelto-ohdake, pyörökurjenpolvi, persiantädyke ja pihatähtimö
Heinien siemeniviljelyset, apilatomat säilöreunurat, heinänurmekit, laitumet	21-31, pensomisvaihe, ennen korrenkasvun alkua	2-2,5	Jääntirypsi ja -rapsi, jauhosavikka, kierumataria, karheapillike, peltosaunio, peltolemmikki, silkkiuniikko, kiertotatar ja pihatähtimö	Lutukka, pyörökurjenpolvi, persiantädyke ja pihatähtimö
Leikkatavat nurmikot ja golfnurmekit	Keväällä ennen voikukan kukkimista	3-3,5	Yllä olevaan listaan lisättynä: Lutukka, peltoemäkkä, pillikkeit, liuskakurjenpolvi ja huisakurjenpolvi	Pelto-ohdake, pyörökurjenpolvi, persiantädyke ja pihatähtimö

Torjuttaessa valvattia ja ohdaketta ovat käytönmääritä valvatilla 2,0 l/ha ja ohdakkeella 2,5 l/ha. Ruiskutus tehdään valvatin tai ohdakkeen 6 – 8 –lehtiasteella.

Vettä käytetään viljan 2-4 –lehtiasteilla 150-200 l/ha ja tätä myöhäisemmissä ruiskutuksissa 200-400 l/ha.

Heinien siemeniviljelyksillä ja nurmikoilla vesimääriä on 200-400 l/ha.

Ruiskutettaessa lämpötilan on oltava yli 12 °C. Kasvustoa, joka kärssi kuivuudesta, liiasta vedestä tai muuten epätavalisista kasvuoloista, ei pidä ruiskuttaa. Käsitteily on vältettävä myös yöpätkästä edeltävänä ja sitä seuraavanä päivänä, koska teho rikkakasveihin heikkenee. Maalajilla ei ole vaikuttusta valmisten tehoon. Valmisten pienimpiä suositeluita annoksia voidaan käyttää edullisissa torjuntaaloissa, kun lämpötila on yli +20°C, rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa ja

ovat kooltaan sirkkalehti – 4 lehtiasteella. Lisäksi jokseenkin kestäävät lajeja kuten orvokkia, hatikkaa, tädykettä ja peippia (syysviljät) eivät saa esiintyä runsaasti. Voikukkaan saadaan paras teho, kun ruiskutus tehdään sen ollessa nuppausteella tai heinää-elokuussa kukan jälkeen.
Ensimmäisen satuvuoden timotei on parempi valmisteelle kuin muut heinälajit.

Ruiskutusnesteen valmistus:

Ruiskun laitetaan ensin puolel tarvittavasta vesimääristä. Valmiste mitataan säiliöön ja sekoituksen ollessa päällä lisätään loppu tarvittavasta vesimääristä. Tyhjät pakkaukset huuhdellaan ja huuhteluvesi kaadetaan ruiskun säiliöön. Sekoitusta jatketaan koko ruiskutuksen ajan.

Herkät viljelykasvit ja jälkkikasvirajoitus:

Seuraavat kasvit ovat arkoja ARIANE S –valmisteelle:

- peruna ja tomaatti
- herne, papu, lupiini, apila ja muut hernekasvit
- porkkana ja muut sarjakukkaiset kasvit
- salaatti ja muut mykerökkukkaiset kasvit

ARIANE S- valmisteella käsitellyt kasvinosat, jotka eivät ole hajonneet, voivat vioittaa arkoja kasveja. Tämän takia älä viljile arkoja kasveja heti sen jälkeen kun ARIANE S:llä käsitelty kasvusto on muokattu maahan.
Valmisteella käsitellyt kasvinosia ei tule käyttää kasvihuoneessa eikä kompostissa.

Uusintakylvö

Uusintakylvössä ARIANE S-käsitteily jälkeen voidaan kylvää vain viljaa, maissia tai muita heinäkasveja. Ennen uusintakylvöä on kaikki kasvijätteet muokattava huolellisesti maahan kultivoimalla tai kyntämällä. Katso myös kohta Käytön rajoitukset.

Tuulikulkeuma:

Vioitaa useimpia vihanneksia, koristekasveja, puita ja pensaita. Ruiskutettaessa on varottava tuulikulkeumaa erityisesti siemenperunaviljelysten läheisyydessä. Arkojen kasvien läheisyydessä on valmistettava käsiteltävä erityisellä varovaisuudella.

Ruiskun pesu:

Jotta välttyään muiden kasvien vioittumiselta ARIANE S -valmisteen ruiskuttamisen jälkeen, on ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear* Extraa tai Ruiskun Tehopesua seuraavasti:

1. Välttämästä ruiskutukseen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
2. Huuhtele ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puominen ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus kytketynä ja huuhtele suuttimet ja letkut tällä pesuliukoksella. Täytä säiliö täyneen vettä ja pidä sekoitus kytketynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä tankki kokonaan.
4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuoksessa, jossa on pesuainetta, esim. 50 ml All Clear

Extraa /10 litraa vettä.

5. Huuhtele tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi vähintään 1/10 osa säiliön tilavuudesta.

Tyhjennä säiliö kokonaan.

6. Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille eikä vesistöön tai pohjaveteen.

Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 4.

*Rekisteröity tuotemerkki - FMC Agricultural Solutions

Bruksändamål:

För bekämpning av ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre, i klöverfria vallar, höfröodlingar, i skyddssåd för klöverfria vallar, i vårdade gräsmattor och golfplaner.

Användningsbegränsningar:**Karenstider:**

Karenstiden för vallar är 30 dygn och för stråsåd som bärgas före mognad, 40 dygn. På den behandlade arealen kan man använda preparat som innehåller clopyralid tidigast 125 dygn efter användning av Ariane S eller övrigt clopyralid innehållande preparat.

Efter Ariane S behandling kan man odla rot- eller knölväxter tidigast nästa växtpériod.

Skall besprutas före stråsädens stråttväxt börjar.

Den behandlade stråsädens halm får inte komposteras och inte användas som växtunderlag för svampar eller ätbara växter.

Förebyggande av miljöskador:

Förörena inte vattendrag med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsigt väder.

På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendraget för att skydda vattenorganismerna.

Sprutans sugaranordning för vatten får inte användas för fyllning av behållare från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag.

Överblivet, obruktbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköllda försäljningsförpackningar skall föras till vederbörlig insamlingsplats för avfall.

Anvisningar om skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskedet då det föreligger risk för preparatstänk bör ansiktsskydd/skyddsglasögon användas och i arbetsskedet då andningsvägarna exponeras bör andningsskydd försett med P2/A2-filter användas.

Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet:

Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet.

För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan:

Skyddsavstånd med olika munstyckstyper						
Användning	Spaltspridarmunstycke	Munstycken som minskar vindavdrift ¹⁾				
		minst				
		50 %	75 %	90 %		
3,5 L/ha	15 m	5 m	3 m	0 m		
2,5 - 3,0 L/ha	10 m	5 m	3 m	0 m		

¹⁾Dyliga munstycken är bl.a. luftassisterade munstycken. Företeckning över munstycken som finns på marknaden för försäljning finns tillgänglig på Tukes nätsidor under adressen www.tukes.fi/vesistorajoitus. I företeckningen visas också tillätta körhastigheter och brukstryck.

Resistenshantering:

De verksamma ämnen som preparatet innehåller tillhör HRAC-gruppen 4 (O) (syntetiska auxiner). I denna grupp är utvecklingsrisken för resistenta ogrässtammar liten. För att förhindra utvecklingen av resistenta ogrässtammar bör man inte efterföljande år på samma skifte använda preparat som tillhör grupp med samma verkningsätt.

Bruksanvisning:

Odlingsväxt	Bruksstidpunkt BBCH	Bruksmängd, l/ha	Ogräs som kan bekämpas och effekt	
			>90 %	70-90 %
Vårsåd och skyddssåd för klöverfria vallar	21-31, bestockningsstadie, före stråskjutningens början	2	Svinmålla, åkervinda, vårtfräta, snärjmåra, baldersbrå, åkerbinda, fettistel, våtarv, spillrybs och -raps samt penninggräs	åkertistel, jordrök, nävor, rödplister och trampgräs
			Blåklint, svinnmålla, åkervinda, vårtfräta, nävor, snärjmåra, mjukplister, baldersbrå, åkerförgåtmigej, sidenvallmo, åkerbinda, pilört, våtarv, lomme, åkerrättika, åkersenap, penninggräs	åkertistel, jordrök, rödplister, trampört, åkerpiölt, korsört och åkerviol
Höstsåd	21-31, bestockningsstadie, före stråskjutningens början	2	Spillrybs och -raps, blåklint, svinnmålla, snärjmåra, baldersbrå, pipdån, åkerförgåtmigej, sidenvallmo och åkerbinda	Lomme, nävor, gatkamomill, trädgårdsveronica och våtarv
			Spillrybs och -raps, lomme, blåklint, svinnmålla, jordrök, snärjmåra, dån, flinknäva, stinknäva, baldersbrå, åkerförgåtmigej, sidenvallmo, åkerbindaåkersenap och våtarv	Åkertistel, klibbnäva, trädgårdsveronica och våtarv
Höfrödlingar, klöverfria ensilagevallar, hövallar, beten	21-31, bestockningsstadie, före stråskjutningens början	2-2,5	Spillrybs- och raps, svinnmålla, snärjmåra, pipdån, baldersbrå, åkerförgåtmigej, sidenvallmo, åkerbinda och våtarv	Lomme, klibbnäva, trädgårdsveronica och våtarv
Vårdade gräsmattor och golfplaner	På våren före maskrosens blomning	3-3,5	Tillägg till företeckningen ovan: Lomme, jordrök, dån, flinknäva och stinknäva	Åkertistel, klibbnäva, trädgårdsveronica och våtarv

Vid bekämpning av fettistel och tistel är bruksmängderna för fettistel 2,0 l/ha och för tistel 2,5 l/ha. Besprutningen görs på fettistels och tistels 6-8 -bladstadiet.

På stråsädens 2-4 bladstadiet används 150-200 l vatten/ha och vid senare besprutningar 200-400 l vatten/ha.

Vid besprutning av höffröodlingar och gräsmattor är vattemängden 200-400 l/ha.

Vid besprutning skall temperaturen vara över 12 °C. Gröda som lider av torka, alltför mycket fukt eller annars av ovanliga växtförhållanden, skall inte besprutas. Behandlingen bör undvikas ett dygn före och efter nattfrost eftersom effekten på ogräs försvagas. Jordarten inverkar inte på preparatet. Preparatets minsta rekommenderade bruksmängder kan användas vid fördelaktiga bekämpningsförhållanden då temperaturen är över +20 °C, då ogräsen är i bra växtskick och är på hjärtblads - 4-bladsstadie. Då får emellertid inte rätt tåliga ogräs som viol, spärgel, ärenpis och plister (höstsåd) förekomma. Bästa effekt på maskros erhålls då besprutningen utförs i knoppstadiet eller i juli-augusti efter blomning.

Första skördeårets timotej är känsligare mot preparatet än övriga hörarter.

Tillredning av sprutvätska:

Sprutbehållaren fylls till hälften med vatten. Preparatmängden mäts och tillsätts i behållaren. Medan blandning pågår tillsätts resten av vattemängden. Tömda förpackningar sköljs och sköljvattnet tillsätts i sprutbehållaren. Håll sprutans blandare igång under hela besprutningen.

Känsliga odlingsväxter och växtföljdsbegränsning:

Följande växter är känsliga för ARIANE S –preparatet:

- potatis och tomat
- ärt, böna, lupin, klöver och övriga ärtväxter
- morot och övriga flockblomstriga växter
- sallat och övriga korgblomstriga växter

Växtdelar av plantor behandlade med ARIANE S som inte förmultnat kan skada känsliga växter. Odla därför inte känsliga växter omedelbart efter att gröda som behandlats med ARIANE S har bearbetats.

Med preparatet behandlad växtmassa skall inte användas i växthus eller kompost.

Omsådd

Vid omsådd efter ARIANE S-behandling kan man enbart så stråsäd, majs eller övriga höväxter. Före omsådd skall samtliga växterester noggrant bearbetas i marken genom kultivering eller plöjning. Se också under punkten Användningsbegränsningar.

Vindavdrift:

Skadar flera grönsaker, prydnadsväxter, träd och buskar. Vid besprutning bör man akta vindavdrift speciellt i närheten av utsädespotatisodlingar. Preparatet skall hanteras speciellt varsamt i närheten av känsliga växter.

Sprutans rengöring:

För att undvika skador på övriga växter efter ARIANE S besprutning skall sprututrustningen tvättas omsorgsfullt både ut- och invändigt med tvättmedel som är avsett för

sprutvätt, t.ex. All Clear* Extra eller Ruiskun Tehopesu enligt följande:

1. Töm sprutbehållaren genast efter besprutning. Tvätta sprutan utvändigt med rent vatten.

2. Skölj sprutbehållaren invändigt och bespruta minst 1/10 av volymen via ramp och munstycken. Töm behållaren helt på åkern.

3. Fyll behållaren till hälften med vatten och tillsätt behövlig mängd tvättmedel. Använd blandaren och skölj munstycken och slangar med den här tvättlösningen. Fyll behållaren med vatten och använd blandaren i 15 minuters tid. Spruta genom munstycken och töm behållaren helt.

4. Munstycken och filter avmonteras och tvättas separat i tvättmedelslösning, t.ex. 50 ml All Clear Extra /10 liter vatten.

5. Skölj behållaren med rent vatten och bespruta vatten genom munstycken minst 1/10 av behållarvolymen. Töm behållaren helt på åkern.

6. Se till att tvättvätskan inte kommer i kontakt med känsliga växter, inte heller i vattendrag eller i grundvatten. Obs! Om behållaren inte kan tömmas helt skall punkt 3 upprepas före man går till punkt 4.

* Registrerat varumärke - FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE
HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE
HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE
HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

Varoitus

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Erittäin myrkyllistä vesielölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyrynen/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojaakäsinetä/suojavaatetusta/silmensuojainta /kasvonsuojainta.

JOS KEMIKALAIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ilmenee ihärsyystä tai ihottuma: Hakeudu lääkärin.

JOS KEMIKALAIA JOUTUU SILMIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Jos silmä-ärsyys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oätkomligt för barn.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för mäniskors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Ariane™ S

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDDEL

GROUP 4 (O) HERBICIDE

UFI: 4M44-FOC7-F004-KH9W

Käyttötarkoitus: Rikkakasvienvaaja syys- ja kevätnäistä, syys- ja kevätohrasta, kaurasta, rukiista ja ruisvehnästä, apilattomien nurmien suojaaviljoista, apilattomilla nurmilla, heinien semenviljelyksiltä sekä leikattavilla nurmikoitoja ja golfnurmilla.

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i höst- och vårvete, höst- och värvorn, råg, rågvete och i havre, i klöverfria vallar, höfröodlingar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i vårdade gräsmattor och golfplaner.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjäryhmä: Ammattiäkäyttäjät

Teohaineet:

MCPA 200 g/l

fluorosipyr 40 g/l

klopyralidi 20 g/l

Valmistetyyppi: EW

Alin varastointilämpötila on 0°C

(suojattuna jäätymisiltä).

Valmisluserän numero ja

valmistuspäivä: Katso pakauksesta.

Säilytys vähintään 2 vuotta

valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:

Corteva Agriscience

Edustaja Suomessa: Corteva Agriscience Finland OY,

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Luvanhallija: Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamina K, Tanska.

Puh. +45 4528 0800

Rekisterinumero: 1683

TM® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesvändare

Verksamma ämnen:

MCPA 200 g/l

fluorosipyr 40 g/l

klopyralidi 20 g/l

Preparattyp: EW

Lägsta förvaringstemperatur är 0°C

(skyddad mot frysning).

Satsnummer och produktionsdatum:

Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare:

Corteva Agriscience

Representant i Finland: Corteva Agriscience

Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.

www.corteva.fi

Tillståndsinnehavare: Corteva Agriscience

Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411

Köpenhamna K, Danmark. Tfn. +45 4528 0800

Registreringsnummer: 1683

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 5 L