



CORTEVA™
agriscience

Rexade™ 440

Arylex™ active

OGRÄSMEDEL

Varoitus

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen jätteepisteeseen. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas sprej. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Valumat on kerättävä. Samla upp spill. Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstjälningsplats. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

0970547852101



Rexade™ 440

Arylex™ active

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

GROUP 4 (O) HERBICIDE

GROUP 2 (B) HERBICIDE

UFI: DH79-70P8-Q007-29XJ

Käyttötarkoitus Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät. **Tehoaine:** pyroksulaami 240 g/kg (24 % w/w) + halauksifeeni-metyyli 100 g/kg (10 % w/w) + florasulaami 100 g/kg (10 % w/w). **Valmistetyyppi:** WG. Alin varastointilämpötila on 0°C. **Valmistuserän numero** ja **valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä. **Valmistaja ja pakkaaja:** Corteva Agriscience.

Edustaja Suomessa: Corteva Agriscience Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Luvanhaltija: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamina K, Tanska. Puh. +45 4528 0800

Rekisterinumero: 3455

Användningsändamål: För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Fullständig bruksanvisning under denna sida. **Användargrupp:** Yrkesanvändare. **Verksamma ämne:** pyroksulaami 240 g/kg (24 % w/w) + halauksifeeni-metyyli 100 g/kg (10 % w/w) + florasulaami 100 g/kg (10 % w/w). **Preparattyp:** WG. Lägsta lagringstemperatur 0°C. **Satsnummer och produktionsdatum:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum. **Tillverkare och förpackare:** Corteva Agriscience.

Representant i Finland: Corteva Agriscience Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Tillståndsinnehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark.

Tfn. +45 4528 0800

Registreringsnummer: 3455

©™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

NETTOTILAVUUS/NETTOINNEHÄLL: 0,500 KG

277158 2211

Käyttötarkoitus:

Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käytön rajoitukset

Varoajat

Ennen täyttöä korjuukypsyttä korjattu rehuvilja (kokoviljasäilörehu ja murskerehu) 37 vrk.

Pohjavesirajoitus

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Vesistörajoitus

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Suosituksukset ja ohjeet

Resistenssin hallinta

Pyroksulaami ja florasulaami kuuluvat HRAC-ryhmään 2 (B) (ALS-inhibiittorit). Riski kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Halauksifeeni-metyyli kuuluu ryhmään 4 (O) (synteettiset auksiinit), jossa riski on pieni. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna.

Varastointi ja säilyvyys

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä

Käyttö	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet		
		50 %	75 %	90 %
37.5 ja 40 g/ha	10 m	5 m	3 m	0 m
50 g/ha	15 m	10 m	5 m	3 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Käyttöohje

Rexade 440 on lehtivaikutteinen valmiste, joka tehoaa sekä heinämaisiiin että leveälehtisiin rikkakasveihin syys- ja kevätvehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä. Rexade 440 tehoaa mm. hukkakauraan, luohon, orvokkiin, saunakukkaan, kiertotattareen, mataraan ja ruiskaunokkiin. Ei saa käsitellä seosviljoja, jotka sisältävät palkokasveja kuten apilaa tai heiniä. Rexade 440 sisältää halauksifeeni-metyyliä, pyroksulaamia ja florasulaamia. Halauksifeeni-metyyli on akrylipikolinaatti, joka kuuluu synteettisiin auksiineihin. Pyroksulaami ja florasulaami kuuluvat ALS inhibiitoreihin. Kaikki tehoaineet liikkuvat systeemisesti kasvilla. Vaikutus näkyy rikkakasvilajista riippuen muutamasta vuorokaudesta muutaman viikon kuluttua käsittelystä. Lopullinen teho on nähtävissä 4-6 viikon kuluttua käsittelystä.

Ruiskutusolosuhteet: Optimaalinen ruiskutusajankohta on lämpötilan ollessa 5 -20°C. Vältä ruiskuttamista hyvin kuivissa tai lämpimissä olosuhteissa. Myös ruiskuttamista ennen hallaa on vältettävä. Saavuttaaksesi parhaan ruiskutustuloksen käsittele rikkakasvit pieninä ja viimeistään rikkakasvin ollessa 6-8 lehtiasteella.

Käyttömäärät ja ruiskutusajankohta

Syysviljoilla: Rexade 440 käyttöaika on viljan kasvuasteella BBCH 23- 32. Rexade 440 suositellaan käytettäväksi yhdessä DASSOIL -kiinnitteen kanssa. Lue kiinnitteen käyttö ja käyttömäärä sen käyttöohjeesta.

Käyttömäärät ja teho rikkakasveihin syysvehnällä, ruisvehnällä ja rukiilla:

Käyttömäärä	Kasvuaste BBCH	Tehokkuus ja rikkakasvilajit		
		Erittäin herkät rikkakasvit (> 95% teho)	Herkät ja erittäin herkät rikkakasvit (85-94,9% teho)	Kohtalaisen herkät rikkakasvit (70-84% teho)
37.5 g/ha + Dassoil	23-29	Lutukka, Matara, Saunakukka, Peltotaskuruoho, Rikkakukonkannus	Luoho, Peltokaali, Peltoemäkki, Punapeippi, Sepiväpeippi, Peltosaunio, Silkkiunikko, Pihatähtimö, Persian tädyke, Kurjennokka	Hukkakaura, Ruiskaunokki, Pelto-orvokki, Peltolemmikki, Murattitädyke, Matara

Käyttömäärä	Kasvuaste BBCH	Tehokkuus ja rikkakasvilajit		
		Erittäin herkät rikkakasvit (> 95% teho)	Herkät ja erittäin herkät rikkakasvit (85-94,9% teho)	Kohtalaisen herkät rikkakasvit (70-84% teho)
50 g/ha + Dassoil	30-32	Luoho, Lutukka, Peltoemäkki, Matara, Saunakukka, Peltosaunio, Peltotaskuruoho, Rikkakukonkannus, Peltokaali, Matara, Kurjennokka	Hukkakaura, Punapeippi, Sepiväpeippi, Peltolemmikki, Silkkiunikko, Pihatähtimö, Murattitädyke, Persian tädyke	Ketotädyke, Pelto-orvokki

Kevätvehnäillä: Rexade 440 käyttöaika on viljan kasvuasteella BBCH 21 - 32. Rexade 440 suositellaan käytettäväksi yhdessä DASSOIL -kiinnitteen kanssa. Lue kiinnitteen käyttö ja käyttömääräsen käyttöohjeesta.

Käyttömäärät ja teho rikkakasveihin kevätvehnäillä

Käyttömäärä	40 g/ha + Dassoil
Teho	Rikkakasvit
Erittäin herkät rikkakasvit (> 95% teho)	Kiertotatar, Hukkakaura, Lutukka, Matara, Peltotaskuruoho, Pihatähtimö, Luoho
Herkät ja erittäin herkät rikkakasvit (85-94,9% teho)	Punapeippi, Jauhosavikka

Kiinnite: Rexade 440 käytetään yhdessä kiinnitteen kanssa (lue kiinnitteen käyttöohje ennen käyttöä)
Vesimäärä: Suositeltava vesimäärä on 100 – 400 l/ha. Alinta vesimäärää voidaan käyttää vain avoimeen kasvustoon ja rikkakasvien ollessa pieniä. Kasvuston ollessa tiheää vesimäärän tulisi olla vähintään 200 l/ha.

Maalajit: Rexade 440:a voidaan käyttää kaikilla maalajeilla.

Sateenkesto: Rexade 440 on sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä.

Tankkiseokset: Rexade 440 ei saa ruiskuttaa tankkiseoksena Bumber 25EC/Tilt 250 EC -valmisteiden kanssa sakkautumisriskin vuoksi. Rexade 440 ei saa sekoittaa tuotteiden kanssa, jotka sisältävät fenoksaproppi-p-etyyliä tai klodinafoppia sisältävien tuotteiden kanssa näiden tehon alenemisen vuoksi. Käsittelyiden välin tulisi olla vähintään 14 vrk.

Huomioitavaa

Stressistä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Jos kasvusto kärsii kylmyyden, kuivuuden, märkyiden, tuhoeläinten, ravinnepuutoksen yms. aiheuttamasta stressistä, vältä ruiskuttamista. Rexade 440 voi toisinaan aiheuttaa vähäistä ja ohimenevää kasvuston kellastumista sekä kasvun pysähtymistä 2-3 viikko ruiskutuksen jälkeen. Tämä ei normaalisti vaikuta satoon.

Uusintakylvö

Normaalisti korjatun sadon jälkeen Rexade 440 keväällä käsitellyllä lohkolla ei ole syksyllä viljelyrajoituksia. Kuitenkin herkkien lajien ollessa kyseessä kuten esim. apila ja linssit, suositellaan kyntämistä ennen näiden lajien kylvöä.

Mikäli kasvusto joudutaan rikkomaan Rexade 440 kevätkäsittelyn jälkeen voidaan 6 viikon kuluttua kynnostä tai jyrstinnästä kylvää viljaa, maissia tai heinäkasveja.

Ruiskutustekniikka

Rexade 440 voidaan ruiskuttaa traktoriin kytkettävällä ruiskulla, joka on hyvässä käyttökunnossa ja kaliproitu valmistajan ohjeen mukaan.

Ruiskutusnesteen valmistus

Ruiskun säiliöön täytetään ensin puolet tarvittavasta vesimäärästä, minkä jälkeen lisätään tarvittava määrä Rexade 440 valmistetta ruiskun yläosasta sekoituspumpun käydessä. Täytä säiliö vedellä ja lisää kiinnite ennen kuin säiliö on täynnä. Pidä ruiskun sekoitin päällä koko ruiskutuksen ajan. Käytä ainoastaan puhdasta vettä.

Mikäli ruisku on varustettu täyttöastialla, joka voidaan täyttää vedellä, seuraavaa tekniikkaa voidaan käyttää:

1. Täytä täyttöastia puoliksi vedellä
2. Kaada tarvittava määrä valmistetta täyttöastiaan.

3. Ime täyttöastian sisältö ruiskun tankkiin ja samaan aikaan lisää puhdasta vettä täyttöastiaan

4. Toista tämä uudelleen niin kauan, että tuotetta ei ole täyttöastiassa.

Ruiskun puhdistus

Huuhtelee huolellisesti ruisku ja mittausvälineet välittömästi vedellä ruiskutuksen jälkeen. Jotta vältetään muiden kasvien vioittumiselta, on ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, (esim. All Clear*) Extraa seuraavasti:

1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
2. Huuhtelee ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjä säiliö kokonaan.
3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus kytkettynä ja huuhtelee suuttimet ja letkut tällä pesuliuksella. Täytä säiliö vedellä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjä tankki kokonaan.
4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuksessa, jossa on pesuainetta, esim. 50 ml All Clear Extraa /10 litraa vettä.

5. Huuhtele tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi vähintään 1/10 osa säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.

6. Käytä pesuvesien hävittämiseen käsiteltyä aluetta. Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille tai maahan, johon aiotaan kylvää arkoja kasveja.

Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 4.

Jos kasvinsuojeluinetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä.

Huolehdi ettei pesuvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Bruksändamål:

För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Anvisningar om skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåligena skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskeden då det föreligger risk för preparatstänk bör ansiktsskydd/skyddsglasögon användas och i arbetsskeden då andningsvägarna exponeras bör andningsskydd försett med P2/A2-filter användas.

Användningsbegränsningar

Karenstider

Fodersäd som är skördad före full mognad (helsädsensilage och krossensilerat foder) 37 dygn.

Grundvattenbegränsning

Växtskyddsmedlet kan röra sig i marken varför det inte får användas på viktiga eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattentäkt (grundvattenområdesklasser I och II). Kring brunnar och källor som används för hushållsvattentäkt bör man lämna en skyddszon på minst 30-100 m som inte behandlas med bekämpningsmedel. Användning av bekämpningsmedel på grova mojordar eller grövre jordarter bör undvikas.

Vattendragsbegränsning

Förorena inte vattendrag med produkten eller dess förpackning.

Undvik besprutning i blåsig väder.

På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning med traktorspruta lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendrag för att skydda vattenorganismerna.

Sprutans suganordning för vatten får inte användas för fyllning av behållare från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag.

Rekommendationer och anvisningar

Resistenshantering

Pyroxulam och florasulam tillhör HRAC-gruppen 2 (B) (ALS-inhibitorer). I denna grupp är utvecklingsrisken av resistent ogrässtammar stor. Halauxifen-metylen tillhör gruppen 4 (O) (syntetiska auxiner) där risken är liten. För att förhindra utvecklingen av resistent ogrässtammar bör man inte efterföljande år på samma skifte använda preparat som tillhör grupp med samma verkningsätt.

Förvaring och hållbarhet

Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar skall föras till vederbörlig insamlingsplats för avfall.

Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet

Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet. För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan:

Skyddsavstånd med olika munstyckstyper

Användning	Spaltspridarmunstycke	Munstycken som minskar vindavdrift		
		50 %	75 %	90 %
37,5 och 40 g/ha	10 m	5 m	3 m	0 m
50 g/ha	15 m	10 m	5 m	3 m

1) Dylika munstycken är bl.a. luftassisterade munstycken. Förteckning över munstycken som finns på marknaden för försäljning finns tillgänglig på Tukes nätsidor under adressen www.tukes.fi/vesistorajoitus. I förteckningen visas också tillåtna körhastigheter och brukstryck.

Bruksanvisning

Rexade 440 är ett bladverkande preparat som har effekt på både gräs- och örtartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete. Rexade 440 har effekt på bl.a. flyghavre, ven, viol, baldersbrå, åkerbinda, måra och blåklint. Blandsäd som innehåller baljväxter såsom klöver eller höväxter får inte behandlas.

Rexade 440 innehåller halauxifen-metyl, pyroxulam ja florasulam. Halauxifen-metyl är ett acrylpicolinat som

tillhör syntetiska auxiner. Pyroxulam och florasulam tillhör

ALS-inhibitorernas grupp. Samtliga verksamma ämnen rör sig systemiskt i växten. Inverkan syns från några dygn till några veckor efter behandling, beroende på ogrässlåg. Den slutliga effekten kan ses efter 4-6 veckor efter behandling.

Besprutningsförhållanden: Optimal brukstid är då temperaturen är 5 - 20°C. Undvik behandling i mycket torra eller varma förhållanden. Man bör också undvika besprutning före nattfrost. För att uppnå bästa besprutningsresultat skall ogräsen bekämpas som små, senast på ogräsens 6-8 -bladstadium.

Bruksmängder och besprutningstidpunkter

Höstsäd: Rexade 440 brukstid är i stråsädens BBCH 23-32 växtstadium. Rexade 440 rekommenderas att användas tillsammans med DASSOIL-fästmedel. Läs om fästmedlets användning och dess bruksmängd i bruksanvisningen.

Bruksmängder och effekt på ogräs i höstvete, rågvete och råg:

Bruksmängd	Växtstadium BBCH	Effekt och ogrässlåg		
		Mycket känsliga ogräs (> 95 % effekt)	Känsliga och mycket känsliga ogräs (85-94,9 % effekt)	Rätt känsliga ogräs (70-84 % effekt)
37,5 g/ha + Dassoil	23-29	Lomme, måra, baldersbrå, penninggräs, riddarsporre	Ven, åkerkål, jordrök, rödplister, mjukplister, baldersbrå, sidenvallmo, våtarv, trädgårdsveronika, skatnäva	Flyghavre, blåklint, åkerviol, åkerförgätmigej, murgrönsveronika, måra

Bruksmängd	Växtstadie BBCH	Effekt och ogrässlag		
		Mycket känsliga ogräs (> 95 % effekt)	Känsliga och mycket känsliga ogräs (85-94,9 % effekt)	Rätt känsliga ogräs (70-84 % effekt)
50 g/ha + Dassoil	30-32	Ven, lomme, jordrök, måra, baldersbrå, penninggräs, riddarsporre, åkerkål, måra, skatnäva	Flyghavre, rödplister, mjukplister, åkerförgåtmeje, sidenvallmo, våtarv, murgroönsveronika, trädgårdsveronika	Fältveronika, åkerviol

Vårvete: Rexade 440 brukstid är i stråsädens BBCH 21-32 växtstadie. Rexade 440 rekommenderas att användas tillsammans med DASSOIL-fästmedel. Läs om fästmedlets användning och dess bruksmängd i bruksanvisningen.

Bruksmängder och effekt på ogräs i vårvete

Bruksmängd	40 g/ha + Dassoil
Effekt	Ogräs
Mycket känsliga ogräs (> 95 % effekt)	Åkerbinda, flyghavre, lomme, måra, penninggräs, våtarv, ven
Känsliga och mycket känsliga ogräs (85-94,9 % effekt)	Rödplister, svinmålla

Fästmedel: Rexade 440 används tillsammans med fästmedel (läs fästmedlets bruksanvisning före användning)

Vattenmängd: Rekommenderad vattenmängd är 100 - 400 l/ha. Den lägsta vattenmängden kan användas enbart i öppen gröda och då ogräsen är små. Då grödan är tät borde vattenmängden vara minst 200 l/ha.

Jordarter: Rexade 440 kan användas på alla jordarter.

Regntålighet: Rexade 440 är regntåligt en timme efter behandling.

Tankblandningar: Rexade 440 får inte besprutas som en tankblandning med Bumber 25EC/Tilt 250 EC -preparaten på grund av risk för fällningar. Rexade 440 får inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-p-etyl eller clodinafop på grund av nedsatt effekt. Tiden mellan behandlingarna borde vara minst 14 dygn.

Att beakta

Gröda som lider av stress får inte behandlas. Om grödan lider av stress orsakad av kyla, torka, fukt, skadeinsekter, näringsbrist o.dyl. skall besprutning undvikas. Rexade 440 kan ibland orsaka lindrig och förbigående gulnad i grödan samt fördröjning i grödans tillväxt 2-3 veckor efter besprutning. Det inverkar vanligtvis inte på skörden.

Omsådd

Efter en normalt skördad gröda efter Rexade 440 vårbehandling har skiftet inga odlingsbegränsningar följande höst. Då det emellertid är frågan om känsliga

växtslag såsom klöver och linser rekommenderas plöjning före de här växtslagens sådd.

Om man är tvungen att bryta grödan efter Rexade 440 vårbehandling kan man 6 veckor efter plöjning eller fräsning så stråsäd, majs eller höväxter.

Besprutningsteknik

Rexade 440 kan besprutas med en traktormonterad spruta i gott skick och som är kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar.

Beredning av sprutvätskan

Sprutbehållaren fylls till hälften med vatten varefter behövlig mängd Rexade 440 tillsätts medan blandning pågår. Fyll därefter den resterande vattenmängden och tillsätt fästmedlet innan behållaren fylls. Håll sprutans blandare igång under transportkörning och under besprutning. Använd endast rent vatten.

Om sprutan är utrustad med påfyllningsanordning som kan fyllas med vatten, kan följande metod användas:

5. Fyll påfyllningsanordningen till hälften med vatten
6. Tillsätt behövlig mängd preparat i påfyllningsbehållaren.
7. Sug påfyllningsbehållarens innehåll i sprutbehållaren och tillsätt samtidigt rent vatten i påfyllningsbehållaren
8. Upprepa tills allt preparat har sugits i sprutbehållaren.

Sprutans rengöring

Skölj sprutan och måttkärnen omsorgsfullt omedelbart efter besprutning. För att undvika skador på övriga växter skall sprututrustningen tvättas omsorgsfullt både ut- och invändigt med tvättmedel som är avsett för spruttvätt, t.ex. All Clear*) Extra enligt följande:

1. Töm sprutbehållaren genast efter besprutning. Tvätta sprutan utvändigt med rent vatten.

2. Skölj sprutbehållaren invändigt och bespruta minst 1/10 av volymen via ramp och munstycken. Töm behållaren helt på åkern.

3. Fyll behållaren till hälften med vatten och tillsätt behövlig mängd tvättmedel. Använd blandaren och skölj munstycken och slangar med den här tvättlösningen. Fyll behållaren med vatten och använd blandaren i 15 minuters tid. Spruta genom munstycken och töm behållaren helt.

4. Munstycken och filter avmonteras och tvättas separat i lösning som består av tvättmedel, t.ex. 50 ml All Clear Extra / 10 l vatten.

5. Skölj behållaren med rent vatten och bespruta vatten genom munstycken minst 1/10 av behållarvolymen. Töm behållaren helt på åkern.

6. Använd besprutat område för besprutning av tvättvatten. Se till att tvättvattnet inte kommer i kontakt med känsliga växter eller i marken där man tänker så känsliga växter.

Obs! Om behållaren inte kan tömmas helt skall punkt 3 upprepas före man går till punkt 4.

Om preparatet har hunnit torka fast i sprutan, låt tvättvätskan cirkulera i sprutan, spruta ut genom munstycken och låt tvättvätskan stå i sprutan under ett dygn (tvättmedlet löser upp fasttorkat preparat). Tvätta och skölj enligt anvisningar ovan.

Se till att tvättvätska eller sköljvatten inte förorsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till att tvätt- eller sköljvatten inte förorenar yt- eller grundvatten.



CORTEVA
agriscience

Rexade™ 440

Arylex™ active

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

GROUP 4 (O) HERBICIDE

GROUP 2 (B) HERBICIDE

UFI: DH79-70P8-Q007-29XJ

Käyttötarkoitus Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.
Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät. **Tehoaine:** pyroksulaami 240 g/kg (24 % w/w) + halauksifeeni-metyyli 100 g/kg (10 % w/w) + florasulaami 100 g/kg (10 % w/w). **Valmistetyyppi:** WG. Alin varastointilämpötila on 0°C. **Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä. **Valmistaja ja pakkaaja:** Corteva Agriscience.
Edustaja Suomessa: Corteva Agriscience Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi
Luvanhaltija: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kööpenhamina K, Tanska. Puh. +45 4528 0800
Rekisterinumero: 3455

Användningsändamål: För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Fullständig bruksanvisning under denna sida. **Användargrupp:** Yrkesanvändare. **Verksamma ämne:** pyroxulam 240 g/kg (24 % w/w) + halauksifeeni-metyyli 100 g/kg (10 % w/w) + florasulam 100 g/kg (10 % w/w). **Preparatyp:** WG. Lägsta lagringstemperatur 0°C. **Satsnummer och produktionsdatum:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum. **Tillverkare och förpackare:** Corteva Agriscience.
Representant i Finland: Corteva Agriscience Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi
Tillståndsinnehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark. Tfn. +45 4528 0800
Registreringsnummer: 3455

™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

NETTOTILAVUUS/NETTOINNEHÄLL: 0,500 KG