

Varoitus

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Ariane™ S

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnästä, syys- ja kevätohrasta, kaurasta, rukiista ja ruisvehnästä, apilattomien nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä sekä leikattavilta nurmikoilta ja golfnurmilta.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaineet:

MCPA 200 g/l

fluoroksiipyri 40 g/l

klopyralidi 20 g/l

Valmistetyyppi: EW

Alin varastointilämpötila on 0°C

(suojattuna jäätymiseltä).

Valmistuserän numero ja

valmistuspäivä: Katso pakkauksesta.

Säilyvyys vähintään 2 vuotta

valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:

Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: Corteva Agriscience Finland OY,

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Luvanhaltija: Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Kööpenhamina K, Tanska.

Puh. +45 4528 0800

Rekisterinumero: 1683

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i höst- och vårmete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre, i klöverfria vallar, höfröodlingar, i skyddssad för klöverfria vallar, i värdade gräsmattor och golfplaner.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:

MCPA 200 g/l

fluoroksiipyri 40 g/l

klopyralid 20 g/l

Preparattyp: EW

Lägsta förvaringstemperatur är 0°C

(skyddad mot frysnig).

Satsnummer och produktionsdatum:

Se behållaren. Hållbar minst 2 år från

stillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare:

Dow AgroSciences

Representant i Finland: Corteva Agriscience

Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.

www.corteva.fi

Tillståndsinnehavare: Corteva Agriscience

Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411

Köpenhamn K, Danmark. Tfn. +45 4528 0800

Registreringsnummer: 1683



™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 5 L

0110819502009

Käytön rajoitukset:

Varoajat:

Varoaika nurmilla on 30 vrk ja ennen tuleutumista korjattavilla viljoilla 40 vrk. Käsitellyllä alalla voidaan käyttää kloporyalidia sisältäviä valmisteita aikaisintaan 125 vuorokautta Ariane S:n tai muun kloporyalidia sisältävän valmisteiden käytöstä lukien.

Ariane S -käsitelyn jälkeen juuri- ja mukulakasveja voi viljellä aikaisintaan seuraavalla kasvukaudella.

Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korrenkasvun alkua.

Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää sienten tai syötävien kasvien kasvualustana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä seastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesiliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huhdellut myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käsitelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:

Valmiste saattaa vioittaa käsitelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja.

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä				
Käyttö	Viuhasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet ¹⁾		
		vähintään		
		50 %	75 %	90 %
3.5 L/ha	15 m	5 m	3 m	0 m
2.5 - 3.0 L/ha	10 m	3 m	3 m	0 m

¹⁾Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoiutus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajoneuudet ja käyttöpainet.

Resistenssin hallinta:

Valmisteen sisältämät tehoaineet kuuluvat HRAC-ryhmään O (synteettiset auksiinit). Riski kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä vähäinen. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustalvataan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla loholla useana peräkkäisenä vuonna.

Käyttöohje:

Viljelykasv	Käyttöaika BBCH	Käyttömäärä, l/ha	Torjuttavissa olevat rikkakasvit ja teho	
			>90 %	70-90 %
Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat	21-31, pensomisvaihe, ennen korrenkasvun alkua	2	Jauhosavikka, peltokierto, viisisädetyräkki, kierumatara, peltosaunio, kiertotatar, peltovalvatti, pihatahtimö, jääntrypsi ja -rapsi ja peltotaskuruoho	pelto-ohdake, peltoemäksi, kurjenpolvet, punapeippi ja pihatatar
		2,5	Ruiskaunokki, jauhosavikka, peltokierto, viisisädetyräkki, kurjenpolvet, kierumatara, sepiväpeippi, peltosaunio, peltolemmikki, silkkiunikko, kiertotatar, ukontatar, pihatahtimö, lutukka, peltoretikka, rikkasinappi, peltotaskuruoho	pelto-ohdake, peltoemäksi, punapeippi, pihatatar, hanhentatar, peltovillakko ja pelto-orvokki
Syysviljat	21-31, pensomisvaihe, ennen korrenkasvun alkua	2	Jääntrypsi ja -rapsi, ruiskaunokki, jauhosavikka, kierumatara, peltosaunio, karheapilliike, peltolemmikki, silkkiunikko ja kiertotatar	Lutukka, kurjenpolvet, pihasaunio, persiantäyde ja pihatahtimö
		3	Jääntrypsi ja -rapsi, lutukka, ruiskaunokki, jauhosavikka, peltoemäksi, kierumatara, pillikkeet., liuskakurjenpolvi, haisukurjenpolvi, peltosaunio, peltolemmikki, silkkiunikko, kiertotatar, rikkasinappi ja pihatahtimö	Pelto-ohdake, pyörökurjenpolvi, persiantäyde ja pihatahtimö
Heinien siemenviljelykset, apilattomat säilörehunurmet, heinänurmet, laitumet	21-31, pensomisvaihe, ennen korrenkasvun alkua	2-2,5	Jääntrypsi ja -rapsi, jauhosavikka, kierumatara, karheapilliike, peltosaunio, peltolemmikki, silkkiunikko, kiertotatar ja pihatahtimö	Lutukka, pyörökurjenpolvi, persiantäyde ja pihatahtimö
Leikkattavat nurmikot ja golfnurmet	Keväällä ennen voikukan kukkimista	3-3,5	Yllä olevaan listaan lisätynä: Lutukka, peltoemäksi, pillikkeet, liuskakurjenpolvi ja haisukurjenpolvi	Pelto-ohdake, pyörökurjenpolvi, persiantäyde ja pihatahtimö

Torjuttaessa valvatia ja ohdaketta ovat käyttömäärät valvatilla 2,0 l/ha ja ohdakkeella 2,5 l/ha. Ruiskutus tehdään valvatin tai ohdakkeen 6 – 8 –lehtiasteella.

Vettä käytetään viljan 2-4 –lehtiasteella 150-200 l/ha ja tätä myöhäisemmissä ruiskutuksissa 200-400 l/ha.

Heinien siemenviljelyksillä ja nurmikoilla vesimäärä on 200-400 l/ha.

Ruiskutettaessa lämpötilan on oltava yli 12 °C. Kasvustoa, joka kärsii kuivuudesta, liiasta vedestä tai muuten epävalvallisista kasvuoloista, ei pidä ruiskuttaa. Käsitelystä on vältettävä myös yöpakkasta edeltävänä ja sitä seuraavana päivänä, koska teho rikkasveihin heikkenee. Maalajilla ei ole vaikutusta valmisteeseen. Valmisteen pienimpiä suositeltuja annoksia voidaan käyttää edullisissa torjuntaoloissa, kun lämpötila on yli +20°C, rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa ja

ovat kooltaan sirkkalehti – 4 lehtiasteella. Lisäksi jokseenkin kestäviä lajeja kuten orvokkia, hatikkaa, tädykettä ja peippiä (syysviljat) ei saa esiintyä runsaasti. Voikukkaan saadaan paras teho, kun ruiskutus tehdään sen ollessa nappuasteella tai heinä-elokuussa kukinnan jälkeen.

Ensimmäisen satovuoden timotei on arempi valmisteelle kuin muut heinäajit.

Ruiskutusnesteen valmistus:

Ruiskuun laitetaan ensin puolet tarvittavasta vesimäärästä. Valmiste mitataan säiliöön ja sekoituksen ollessa päällä lisätään loppu tarvittavasta vesimäärästä. Tyhjat pakkaukset huuhdellaan ja huuhteluvesi kaadetaan ruiskun säiliöön. Sekoitusta jatketaan koko ruiskutuksen ajan.

Herkät viljelykasvit ja jälkikasvirajoitus:

Seuraavat kasvit ovat arkoja ARIANE S –valmisteelle:

- peruna ja tomaatti
- herne, papu, lupiini, apila ja muut hernekasvit
- porkkana ja muut sarjakukkaiset kasvit
- salaatti ja muut mykerökukkaiset kasvit

ARIANE S- valmisteella käsitellyt kasvinosat, jotka eivät ole hajonneet, voivat vioittaa arkoja kasveja. Tämän takia älä viljele arkoja kasveja heti sen jälkeen kun ARIANE S:llä käsitelty kasvusto on muokattu maahan.

Valmisteella käsiteltyjä kasvinosia ei tule käyttää kasvihuoneessa eikä kompostissa.

Uusintakylvö

Uusintakylvössä ARIANE S-käsittelyn jälkeen voidaan kylvää vain viljaa, maissia tai muita heinäkasveja. Ennen uusintakylvöä on kaikki kasvijätteet muokattava huolellisesti maahan kultivoimalla tai kyntämällä. Katso myös kohta Käytön rajoitukset.

Tuulikulkeuma:

Vioittaa useimpia vihanneksia, koristekasveja, puita ja pensaita. Ruiskutettaessa on varottava tuulikulkeumaa erityisesti siemenperunaviljelysten läheisyydessä. Arkojen kasvien läheisyydessä on valmistetta käsiteltävä erityisellä varovaisuudella.

Ruiskun pesu:

Jotta vältytään muiden kasvien vioittumiselta ARIANE S -valmisteen ruiskuttamisen jälkeen, on ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear* Extraa tai Ruiskun Tehopesua seuraavasti:

1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
2. Huuhtelee ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus kytkettynä ja huuhtelee suuttimet ja letkut tällä pesuliuksella. Täytä säiliö täyteen vettä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä tankki kokonaan.
4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuksessa, jossa on pesuainetta, esim. 50 ml All Clear

Extraa /10 litraa vettä.

5. Huuhtelee tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi vähintään 1/10 osa säiliön tilavuudesta.

Tyhjennä säiliö kokonaan.

6. Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille eikä vesistöön tai pohjaveteen.

Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 4.

*Rekisteröity tuotemerkki - FMC Agricultural Solutions

Bruksändamål:

För bekämpning av ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre, i klöverfria vallar, höfröodlingar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i vårdade gräsmattor och golfplaner.

Användningsbegränsningar:

Karenstider:

karenstiden för vallar är 30 dygn och för stråsäd som bärgas före mognad, 40 dygn. På den behandlade arealen kan man använda preparat som innehåller clopyralid tidigast 125 dygn efter användning av Ariane S eller övrigt clopyralid innehållande preparat.

Efter Ariane S behandling kan man odla rot- eller knölväxter tidigast nästa växtperiod.

Skall besprutas före stråsädens stråttillväxt börjar.

Den behandlade stråsädens halm får inte komposteras och inte användas som växtunderlag för svampar eller ätbara växter.

Förebyggande av miljöskador:

Förören inte vattendrag med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsigt väder.

På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendraget för att skydda vattenorganismerna.

Sprutans suganordning för vatten får inte användas för fyllning av behållare från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag.

Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar skall föras till vederbörlig insamlingsplats för avfall.

Anvisningar om skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetskedan då det föreligger risk för preparatstänk bör ansiktsskydd/skyddsglasögon användas och i arbetskedan då andningsvägarna exponeras bör andningsskydd försett med P2/A2-filter användas.

Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet:

Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet.

För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan:

Skyddsavstånd med olika munstyckstyper				
Användning	Spaltspridarmunstycke	Munstycken som minskar vindavdrift ¹⁾		
		minst		
		50 %	75 %	90 %
3,5 L/ha	15 m	5 m	3 m	0 m
2,5 - 3,0 L/ha	10 m	5 m	3 m	0 m

¹⁾Dylika munstycken är bl.a. luftassisterade munstycken. Förteckning över munstycken som finns på marknaden för försäljning finns tillgänglig på Tukes nätsidor under adressen www.tukes.fi/vesistorajoitus. I förteckningen visas också tillåtna körhastigheter och brukstryck.

Resistenshantering:

De verksamma ämnen som preparatet innehåller tillhör HRAC-gruppen O (syntetiska auxiner). I denna grupp är utvecklingsrisken för resistent ogrässtammar liten. För att förhindra utvecklingen av resistent ogrässtammar bör man inte efterföljande år på samma skifte använda preparat som tillhör grupp med samma verkningsätt.

Bruksanvisning:

Odlingsväxt	Brukstidpunkt BBCH	Bruksmängd, l/ha	Ogräs som kan bekämpas och effekt	
			>90 %	70-90 %
Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar	21-31, bestockningsstadie, före stråskjutningens början	2	Svinmålla, åkervinda, vartfräta, snärjmåra, baldersbrå, åkerbinda, fettistel, våtarv, spillrybs och -raps samt penninggräs	åkertistel, jordrök, nävor, rödplister och trampgräs
		2,5	Blåklint, svinmålla, åkervinda, vartfräta, nävor, snärjmåra, mjukplister, baldersbrå, åkerförgätmigej, sidenvallmo, åkerbinda, pilört, våtarv, lomme, åkerrättika, åkersenap, penninggräs	åkertistel, jordrök, rödplister, trampört, åkerpilört, korsört och åkerviol
Höstsäd	21-31, bestockningsstadie, före stråskjutningens början	2	Spillrybs och -raps, blåklint, svinmålla, snärjmåra, baldersbrå, pipdån, åkerförgätmigej, sidenvallmo och åkerbinda	Lomme, nävor, gatkamomill, trädgårdsveronika och våtarv
		3	Spillrybs och -raps, lomme, blåklint, svinmålla, jordrök, snärjmåra, dån, fliknäva, stinknäva, baldersbrå, åkerförgätmigej, sidenvallmo, åkerbindaåkersenap och våtarv	Åkertistel, klibbnäva, trädgårdsveronika och våtarv
Höfröodlingar, klöverfria ensilagevallar, hövallar, beten	21-31, bestockningsstadie, före stråskjutningens början	2-2,5	Spillrybs- och raps, svinmålla, snärjmåra, pipdån, baldersbrå, åkerförgätmigej, sidenvallmo, åkerbinda och våtarv	Lomme, klibbnäva, trädgårdsveronika och våtarv
Vårdade gräsmattor och golfplaner	På våren före maskrosens blomning	3-3,5	Tillägg till förteckningen ovan: Lomme, jordrök, dån, fliknäva och stinknäva	Åkertistel, klibbnäva, trädgårdsveronika och våtarv

Vid bekämpning av fettistel och tistel är bruksmängderna för fettistel 2,0 l/ha och för tistel 2,5 l/ha. Besprutningen görs på fettisteln och tisteln 6-8 -bladstadiet.

På stråsådens 2-4 bladstadiet används 150-200 l vatten/ha och vid senare besprutningar 200-400 l vatten/ha.

Vid besprutning av höfröodlingar och gräsmattor är vattenmängden 200-400 l/ha.

Vid besprutning skall temperaturen vara över 12 °C. Gröda som lider av torka, alltför mycket fukt eller annars av ovanliga växtförhållanden, skall inte besprutas. Behandlingen bör undvikas ett dygn före och efter nattfrost eftersom effekten på ogräs försvagas. Jordarten inverkar inte på preparateffekten. Preparatets minsta rekommenderade bruksmängder kan användas vid fördelaktiga bekämpningsförhållanden då temperaturen är över +20

°C, då ogräsen är i bra växtskick och är på hjärtblads - 4-bladsstadiet. Då får emellertid inte rätt tåliga ogräs som viol, spårgel, ärenpris och plister (höstsäd) förekomma. Bästa effekt på maskros erhålls då besprutningen utförs i knoppstadiet eller i juli-augusti efter blomning.

Första skördeårets timotej är känsligare mot preparatet än övriga höarter.

Tillredning av sprutvätska:

Sprutbehållaren fylls till hälften med vatten. Preparatmängden mäts och tillsätts i behållaren. Medan blandning pågår tillsätts resten av vattenmängden. Tömda förpackningar sköljs och sköljvattnet tillsätts i sprutbehållaren. Håll sprutans blandare igång under hela besprutningen.

Känsliga odlingsväxter och växtföljdsbegränsning:

Följande växter är känsliga för ARIANE S –preparatet:

- potatis och tomat
- ärt, böna, lupin, klöver och övriga ärtväxter
- morot och övriga flockblomstriga växter
- sallat och övriga korgblomstriga växter

Växtdelar av plantor behandlade med ARIANE S som inte förmultnat kan skada känsliga växter. Odlad därför inte känsliga växter omedelbart efter att gröda som behandlats med ARIANE S har bearbetats.

Med preparatet behandlad växtmassa skall inte användas i växthus eller kompost.

Omsädd

Vid omsädd efter ARIANE S-behandling kan man enbart så stråså, majs eller övriga höväxter. Före omsädd skall samtliga växtrester noggrant bearbetas i marken genom kultivering eller plöjning. Se också under punkten Användningsbegränsningar.

Vindavdrift:

Skadar flera grönsaker, prydnadsväxter, träd och buskar. Vid besprutning bör man akta vindavdrift speciellt i närheten av utsädespotatisodlingar. Preparatet skall hanteras speciellt varsamt i närheten av känsliga växter.

Sprutans rengöring:

För att undvika skador på övriga växter efter ARIANE S besprutning skall sprututrustningen tvättas omsorgsfullt både ut- och invändigt med tvättmedel som är avsett för

sprutvätt, t.ex. All Clear* Extra eller Ruiskun Tehopesu enligt följande:

1. Töm sprutbehållaren genast efter besprutning. Tvätta sprutan utvändigt med rent vatten.
2. Skölj sprutbehållaren invändigt och bespruta minst 1/10 av volymen via ramp och munstycken. Töm behållaren helt på åkern.
3. Fyll behållaren till hälften med vatten och tillsätt behövlig mängd tvättmedel. Använd blandaren och skölj munstycken och slangar med den här tvättlösningen. Fyll behållaren med vatten och använd blandaren i 15 minuters tid. Spruta genom munstycken och töm behållaren helt.
4. Munstycken och filter avmonteras och tvättas separat i tvättmedelslösning, t.ex. 50 ml All Clear Extra /10 liter vatten.
5. Skölj behållaren med rent vatten och bespruta vatten genom munstycken minst 1/10 av behållarvolymen. Töm behållaren helt på åkern.
6. Se till att tvättvätskan inte kommer i kontakt med känsliga växter, inte heller i vattendrag eller i grundvatten. Obs! Om behållaren inte kan tömmas helt skall punkt 3 upprepas före man går till punkt 4.

*Registrerat varumärke - FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE
HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE
HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE
HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

Varoitus

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Jos silmäärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Ariane™ S

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnästä, syys- ja kevätohrasta, kaurasta, rukiista ja ruisvehnästä, apilattomien nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä sekä leikattavilta nurmikoilta ja golfnurmilta.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaineet:

MCPA 200 g/l

fluroksipyyri 40 g/l

klopyralidi 20 g/l

Valmistetyyppi: EW

Alin varastointilämpötila on 0°C

(suojattuna jäätymiseltä).

Valmistuserän numero ja

valmistuspäivä: Katso pakkauksesta.

Säilyvyys vähintään 2 vuotta

valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:

Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: Corteva Agriscience Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Luvanhaltija: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kööpenhamina K, Tanska.

Puh. +45 4528 0800

Rekisterinumero: 1683

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre, i klöverfria vallar, höfröodlingar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i vårdade gräsmattor och golfplaner.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:

MCPA 200 g/l

fluroxipyr 40 g/l

klopyralid 20 g/l

Preparatyp: EW

Lägstä förvaringstemperatur är 0°C

(skyddad mot frysnis).

Satsnummer och produktionsdatum:

Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare:

Dow AgroSciences

Representant i Finland: Corteva Agriscience Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Tillståndsinnehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark. Tfn. +45 4528 0800

Registreringsnummer: 1683



™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 5 L