

**Varoitus**

Ärsyttää ihoa.  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Saattaa aiheuttaa unelaisuutta ja huimausta.

Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryns/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojakäsineitä/suojaavatusta/silmien suojausta/kasvonsuojaista.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhmostusta.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKSEKSEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoilinvointia.

Jos silmä-ärsyts jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaata: Hakeudu lääkäriin.

Varastoi lukituissa tilassa.

Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**Warning**

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kan göra att man blir dåsig eller om töcknad.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögongskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går där. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Vid beständige ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Förvaras inlåst.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



3 362130 138525 >



Dow AgroSciences

# Starane™ XL

## RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

**Käyttötarkoitus:** Rikkakasviens torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemeniviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaaviljoista, golflurmilta sekä syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

**Käyttäjäryhmä:** Ammattikäyttäjät

**Tehoaineet:**

florasulaami 2,5 g/l

fluoroksyppi 100 g/l

Sisältää myös: 1,2-bentsisotiaatsol-3(2H)-onia sekä liuotinbensiniää (maaöljy), kevyt aromaattinen.

**Valmistetyyppi:** SE

Alin varastointilämpötila on +0°C.

**Valmistuseän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

**Valmistaja ja pakkaja:**

Dow AgroSciences

**Edustaja Suomessa:** DP Agrosciences Finland OY, Teknobelevardi 3-5, 01530 Vantaa

**Luvanhaltija:** Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamna K, Tanska

**Rekisterinumero:** 2842

Nettotilavuus/nettovolym: 5 L

©™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

P1108423891901



**Käyttötarkoitus:**

Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmiltä, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, golfnurmilta sekä syys- ja kevätehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta.

**Käytön rajoitukset:**

Eläimet voi päästää laitumelle tai satoa korjata 10 vuorokauden kuluttua käsitteystä. Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saatuta vesi tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesiliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyyss vesistöihin. Traktoriruiskun täytöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täytölaittaa eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojuelaine voi kulkeuttaa maassa, minkä vuoksi kasvinsuojueluinetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäytöön soveltuville pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojuelua-neella käsittelämätön suoavyöhyke. Kasvinsuojuelaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käytökelvoton kasvinsuojuelaine viedäään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

**Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalinkestäviä suojakäsineteitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaara aiheutavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojaista varustettuna P2/A2 suodattimella.

**Käsitellyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelu:**

Valmiste saattaa vioittaa käsitellyalueen ulkopuolisista viljely- ja luonnonkasveja.

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suointyppi			
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaan vähentävät suuttimet		
	50 %	75 %	90 %
3 m	3 m	0 m	0 m

**Käyttöohje:**

Säilörehu- ja heinänurmeksi ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Jo syksyllä ruusuukeasteelle kasvanut peltokankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään peltokankaalin kukkavarren pituuskasvuaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa parasta ruiskutusaikaa on hierakan täydellä ruusuukeastella.

Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinän 2-4-lehtivaiheessa pienintä suositeltua annosta käytäen.

**Käyttömäärä ja teho rikkakasvilaiteittain:**

Viljelykasvi	Ruiskutus-ajankohta BBCH	Käyttömäärä, l/ha	Erittäin hyvä teho >90%	Hyvä teho 70-90%
Säilörehunurmek Heinänurmek Laitumet Heinien siemenviljelykset Golfnurmek	20-39	1.vuoden kasvustot 1.5	Lutukka, Mäkilutukka, Luhtalitukka, Ruiskaunokki, Rikkakukonkannus, Ketokelto, Kierumatara, Kurjenpolvet, Liuskahäränsilmä, Linnunkaali, Saunakukka, Unikko, Pihatatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso	Peltokaalit, Pillikkeet, Peltolemmikki, Hierakka, Voikukka
		2.vuoden ja vanhemmat kasvustot 1.8		
Syysvehnä Syysohra Ruisvehnä Ruis	23-29	0.8	Peltokaalit, Lutukka, Ketokelto, Kierumatara, Saunakukka, Peltolemmikki, Unikko, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso	Ruiskaunokki, Pillike
		1.2	Lutukka, Ruiskaunokki, Rikkakukonkannus, Keirumatara, Linnunkaali, Unikko, Kiertotatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso	Peltokaalit, Pillike, Saunakukka
	30-45			
Kevätvehnä Ohra	13-19	0.36	Kierumatara, Saunakukka, Peltoretikka,	Hukanputki, Kiertotatar,
Kevätvehnä Ohra Kaura Nurmien suojaviljat	20-29	0.8	Hukanputki, Lutukka, Kierumatara, Saunakukka, Kiertotatar, Hanhentatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso	Peltomäkki, Pillikkeet, Peipit, Kiertotatar, Peltomäkki,
		1.0	Saunakukka, Peltoretikka, Pihatähtimö, Peltovillakko, Rikkasinappi, Mustakoiso	Punapeippi, Kiertotatar

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.

**Huomautukset:**

Laitumilla ja muilla nurmilla valmistetta voi käyttää kaikilla nurmiheinälajeilla.

Heinien siemenviljelyksillä Starane XL sopii käytettäväksi timotellillä, raiheimillä, niittynurmikalla ja punanadalla.

Starane XL tehoaan hyvin seuraavien rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio, pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokankaali, peltoukonauris ja voikukka. Teho savikkaan on tydyttävä. Orvokkiin ja tädyläkeeseen teho ei ole riittävä.

Pienannossaineiden seoskumppanina Starane XL katkaisee kestävien rikkakasvikantojen muodostumisen.

Valmiste voidaan ruiskuttaa seoksena useimpien muiden rikkakasvien, kasvitaalien ja hyönteisten torjuntaan käytettävien kasvinsuojuelaineiden sekä kasvunsääteiden kanssa.

Starane XL voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5°C. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Ruiskutuksen jälkeen on oltava vähintään 1 tunti sateetonta.

Valmisteelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäässä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Valmisten käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärssi kuvuudesta, liiasta vedestä, yöhälloista ym.

Jos Starane XL:illä käsittelyt lohko joudutaan rikkomaan, saa samalle lohkolla käsittelyvuonna kylvää viljaa, maissia tai raiheinää.

Varastoitava kuivassa ja > 0 °C lämpötilassa.

#### Ruiskun pesu:

Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti. Mikäli seuraavaksi käsittellään muuta kuin viljaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla.
2. Huuhtele säiliö, pumpu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.
3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine ja oikea väkeyvyys) n. 20% säiliön tilavuudesta.
4. Pese:
  - I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi
  - II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten
    - muista myös täytötaukon sihti, säiliön kanssi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täytösäiliö ym.
    - painepesuria käyttäässäsi pitää myös siinä olla pesuainetta
  - III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.
  - IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteesäään
  - 5. Huuhtele mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtele myös ruiskun ulkopinta ym.

Jos kasvisinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästää sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä.

Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhtelubesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhtelubesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

#### Bruksändamål:

För bekämpning av ogräs i klöverfria vallar, höfrödlingar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i golfgräsmattor samt i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre.

#### Användnings begränsningar:

Djuren kan släppas på bete eller skörden kan bärgas 10 dygn efter behandling. Skall användas före stråsädens stråtilväxt börjar. Får inte användas i skyddssäd för eller i klöverrika vallar. Halm för behandlad stråsäd får inte komposteras eller användas som växtunderlag i växthus.

#### Förebyggande av miljöskador:

Förerena inte vattendrag med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsigt väder. På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendraget för att skydda vattenorganismerna. Sprutans sugarordning för vatten får inte användas för fyllning av behållare från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag.

Växtskyddsmedlet kan röra sig i marken varför växtskyddsmedlet inte får användas på viktiga eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattentäkt (grundvattnenområdesklasser I och II). Kring brunnar och källor som används för hushållsvattentäkt bör man lämna en skyddszon på minst 30-100 m som inte behandlas med bekämpningsmedel. Användning av bekämpningsmedel på grova mojordar eller grövre jordarter bör undvikas.

Överblivet, obruktart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar skall föras till vederbörlig insamlingsplats för avfall.

#### Anvisningar om skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetskedden då det föreligger risk för preparatstänk bör ansiktsskydd/skyddsglasögon användas och i arbetskedden då andningsvägarna exponeras bör andningsskydd försett med P2/A2-filter användas.

#### Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet:

Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet.  
För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsvästånd lämnas enligt tabellen nedan:

Spaltspridarmunstycke	Typ av munstycke		
	Munstycken som minskar vindavdrift		
	50 %	75 %	90 %
3 m	3 m	0 m	0 m

#### Bruksanvisning:

Ensilage- och hövallarna besprutas på våren då tillväxten börjar eller efter skörd då ogräsen igen växer bra. Sommargyllen som redan på hösten bildat bladrosetter skall besprutas på våren genast då växtpérioden börjar eller senast då sommargyllen börjar bilda blomstänglar. Vid bekämpning av krussyra på betesvallar är den bästa besprutningstiden då ogräsen är på rosettbladstadiet.

Klöverfria vallar som anläggs utan skyddssäd besprutas på höets 2-4-bladstadium med minsta rekommenderade dos.

## Bruksmängd och effekt ogräsvis:

Odlingsväxt	Besprutnings-tidpunkt BBCH	Bruksmängd l/ha	Mycket bra effekt >90 %	Bra effekt 70-90 %
Ensilagevallar Hövallar Betesvallar Vallfröodlingar Golfplaner	20-39	1. årets grödor 1,5	<i>Lomme, Bergbråsma, Ängsbråsma, Blåklint, Riddarsporre, Klofibbla, Snärjmåra, Nåvor, Rotfibbla, Harkål, Baldersbrå, Vallmo, Trampgräs, Åkerrättika, Våtarv, Nattskatta</i>	<i>Majrova, Dån, Åkerförgätmigej, Ångsyra, Maskros</i>
		2. årets och äldre grödor 1,8		
Höstvete Höstkorn Rågvete Råg	23-29	0,8	<i>Majrova, Lomme, Klofibbla, Snärjmåra, Baldersbrå, Åkerförgätmigej, Vallmo, Åkerrättika, Våtarv, Nattskatta</i>	<i>Blåklint, Dån</i>
		30-45	<i>Lomme, Blåklint, Riddarsporre, Snärjmåra, Harkål, Vallmo, Åkerbinda, Åkerrättika, Våtarv, Nattskatta</i>	<i>Majrova, Dån, Baldersbrå,</i>
Vårvete Korn	13-19	0,36	<i>Snärjmåra, Baldersbrå, Åkerrättika,</i>	<i>Vildpersilja, Åkerbinda,</i>
Vårvete Korn Havre Vallarnas skyddssäd	20-29	0,8	<i>Vildpersilja, Lomme, Snärjmåra, Baldersbrå, Åkerbinda, Pilört, Åkerrättika, Våtarv, Nattskatta</i>	<i>Jordrök, Dån, Plister, Åkerbinda, Jordrök,</i>
		30-39	<i>Baldersbrå, Åkerrättika, Våtarv, Korsört, Åkersenap, Nattskatta</i>	<i>Rödplister, Åkerbinda</i>

Vattenmängden är 100 - 300 l/ha.

### Anmärkningar:

På beten och andra vallar kan preparatet användas i alla vallväxtslag.

I vallfröodlingar kan Starane XL användas på timotej, rajgräs, ängsröe och rödsvingel.

Starane XL har bra effekt på följande ogräs: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, blåklint, penninggräs, åkersenap, rybs, raps, åkerbinda, förgätmigej, pilört, harkål, lomme, sommargyllen, åkergyllen och maskros.

Preparatet har tillfredsställande effekt på svinnmålla. Effekten på viol och veronika är otillräcklig.

Som blandningskumpan med lågdospreparat bryter Starane XL bildningen av resistenta ogrässtammar.

Preparatet kan besprutas som en blandning med de flesta, mot ogräs, växtsjukdomar och insekter använda växtskyddsmedel samt med växtregulatorer.

Starane XL kan besprutas då temperaturen är över 5°C. Preparatet verkar enbart genom ogräsens blad. Besprutningen är regnfällig efter en timme.

Mycket känsliga växter är ärt, böna och andra balvjäster samt tomat och potatis. Sprutan skall tvättas omsorgsfullt genast efter användning före besprutning av känsliga växter. Preparatet är inte att rekommendera om växthigheten lider av torka, fukt, nattfrost o.dyl.

Om med Starane XL behandlat skifte måste brytas upp får man så stråsäd, majs eller rajgräs på skiftet. Skall lagras torrt och i > 0 °C temperatur.

### Sprutans rengöring:

Tvätta sprutan omsorgsfullt genast efter användning. Om man därefter besprutar annan gröda än stråsäd skall sprutan tvättas enligt följande:

1. Töm behållaren helt på åkern.
2. Skölj behållare, pump, slangar och munstycken, om möjligt, redan på åkern.
3. Blanda tvättvätska (obs. rätt tvättmedel och rätt koncentration) och fyll ca 20% av behållarvolymen med den.
4. Tvätta så här:
  - I låt tvättlösningen cirkulera via pumpen och spruta ut vätskan via munstycken
  - II borsta behållaren med tvättlösning ända upp till
    - kom också ihåg påfyllningssilen, behållarlocket, sprutans ytter ytter och rampen, eventuell påfyllningsbehållare m.fl. delar.
    - vid användning av trycktvätt skall alltid också tvättmedel användas
  - III spruta ut tvättlösning via rampen i 5-10 minuters tid.
  - IV tvätta munstycken och filter i en hink i separat tvättlösning
5. Skölj helst två gånger: låt sköljvattnet cirkulera genom sprutans alla delar och skölj också sprutan utanpå.

Om preparatet har hunnit torka fast i sprutan, låt tvättvätskan cirkulera i sprutan, spruta ut genom munstycken och låt tvättvätskan stå i sprutan under ett dygn (tvättmedlet löser upp fasttorkat preparat). Tvätta och skölj enligt anvisningar ovan.

Se till att tvättvätska eller sköljvattnet inte förorsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till att tvätt- eller sköljvattnet inte förenar yt- eller grundvatten.

## Varoitus

Ärsyttää ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Ärsyttää voimakasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimautta.

Erittäin myrkyläistä vesielölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vältä pölyn/savun/saunun/höyryyn/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojakäsineteitä/suojavaatetusta/silmiensuojaista /kasvonsuojaista.

JOS KEMIKALAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsalla vedellä.

JOS KEMIKALAALIA JOUTUU SILMIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhnotusta.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKSEEN tai lääkärin jos ilmenee pahoinvointia.

Jos silmä-ärsytyy jatkuvasti: Hakeudu lääkärin.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärin.

Varasto lukituissa tilassa.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



## Varning

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögongkydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Förvaras inläst.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, fölж bruksanvisningen.



3 362130 138525 >



Dow AgroSciences

# Starane™ XL

## RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

**Käyttötarkitus:** Rikkakasvienv torjuntaan apilatromilta nurmilta, heinien siemenivilljelyksiltä, apilatromien nurmien suojaaviljoista, golfnurmilta sekä syys- ja kevätehäniltä, syys- ja kevätohralta, rukiilita, ruisvehnältä, kauralta.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

**Käyttäjäryhmä:** Ammattikäyttäjät

**Tehoaineet:**

florasulami 2,5 g/l

fluroksipyri 100 g/l

Sisältää myös: 1,2-bentsisotialsol-3(2H)-oni sekä liuotinbensiiniä (maaöljy), kevyt aromaattinen.

**Valmistetyyppi:** SE

Alin varastointilämpötila on +0°C.

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

**Valmistaja ja pakkaja:**

Dow AgroSciences

**Edustaja Suomessa:** DP Agrosciences Finland OY,

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

**Luvanhallija:** Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamna K, Tanska

**Rekisterinumero:** 2842

Nettotilavuus/nettovolym: 5 L

© TMTrademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

**Användningsändamål:** För bekämpning av ogräs i klöverfria vallar, höfrödingar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i golgräsmattor samt i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

**Användargrupp:** Yrkesanvändare

**Verksamma ämnen:**

florasulami 2,5 g/l

fluroksipyri 100 g/l

Innehåller också: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-oni samt lösningsmedelsbensin (jordolja), lätt aromatiskt.

**Preparatyyp:** SE

Lägsta lagrings temperatur +0°C.

**Satsnummer och produktionsdatum:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverknings datum

**Tillverkare och förpackare:**

Dow AgroSciences

**Representant i Finland:** DP Agrosciences Finland OY,

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

**Tillståndsinnehavare:** Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamna K, Danmark

**Registreringsnummer:** 2842

